



Informacja dla lekarza

W materiale przedstawiono kilka złożonych zestawień składów, przydatnych w praktyce lekarza ginekologa.

Leki recepturowe uzupełniają armamentarium w stanach chorobowych wymagających doraźnego zastosowania preparatu w zindywidualizowanej dawce bądź stężeniu. Preparaty rekomendowane są w doraźnym leczeniu stanów wymagających szybkiego działania, takich jak zakażenia bakteryjne, grzybicze, pierwotniakowe, stany zapalne.

W podanych przepisach uwzględniono nowoczesne podłoże dostępne w polskiej recepturze do sporządzania czopków i globulek - Witepsol H15.

Zaletą leków wykonanych z tym podłożem jest:

- brak konieczności przechowywania w lodówce (z wyjątkiem preparatów z nystatyną);
- zgodność z substancjami stosowanymi w recepturze;
- dobre wchłanianie (w wyniku emulgowania z płynami jam ciała);
- odporność na jęłczenie;
- wygoda aplikacji.

Rp.

Neomycini sulfatis	2,0
Aquae purificatae	10,0
Celugeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

D.S. 2 razy dziennie

Wskazania: Leczenie zewnętrznych stanów bakteryjnych

Rp.

Metronidazoli	0,5 (lub 1,0)
Detreomycini	0,3
Acidi borici	0,1
Sacchari Lactis	0,15
Witepsoli	q.s.
M.f.globul.vaginal.	D.t.d. N° 12

D.S. 1 globulkę na noc

Wskazania: Ostre zakażenia bakteryjno-pierwotniakowe

Rp.

Ethacridini lactici	0,15
Lactosi	
Benzocaini	aa 0,2
Witepsoli	q.s.
M.f.globul.vaginal.	D.t.d. N° 12

D.S. 2 razy dziennie 1 globulkę

Wskazania: Ropne zapalenie pochwy

Rp.

Gentamycini sulfurici	0,08
Prednisoloni	0,004
Clotrimazoli	0,2
Acidi borici	0,06
Witepsoli	q.s.
M.f.globul.vaginal.	D.t.d. N° 12

D.S. 1 globulkę na noc

Wskazania: Mieszane zakażenia bakteryjno-grzybicze z towarzyszącym swiędem

Rp.

Erythromycini	0,6
Acidi borici	0,04
Sacchari Lactis	0,2
Witepsoli	q.s.
M.f.globul.vaginal.	D.t.d. N° 12

D.S. 1 globulkę na noc

Wskazania: Zapalenia bakteryjne reagujące na makrolidy właściwe

Rp. Pełnopłatna

Acicloviri (ex Heviran)	0,8
Sacchari Lactis	0,2
Vit. A	5000 j.m.
Witepsoli	q.s.
M.f.globul.vaginal.	D.t.d. N° 12

D.S. 1 globulkę na noc

Wskazania: Wirusowe zapalenie pochwy

Rp.

Nystatini	10 mln j.m.
Glyceroli 85%	
Acidi lactici	aa 5,0
Celugeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

D.S. 1 raz na noc

Wskazania: leczenie zakażeń grzybiczych

Rp.

Neomycini sulfurici	0,25
Nystatini	200 000 j.m.
Acidi lactici	0,01
Witepsoli	q.s.
M.f.globul.vaginal.	D.t.d. N° 12

D.S. 1 globulkę na noc

Wskazania: Mieszane zakażenia bakteryjno-grzybicze

Rp.

Clotrimazoli	2,0
Benzocaini	1,0
Glyceroli 85%	3,0
Celugeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

D.S. 1-2 razy dziennie

Wskazania: Leczenie stanów drożdżakowych z towarzyszącym świądem

Rp.

Cuprii sulfurici	0,3
Aquae purificatae	1,5
Celugeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

D.S. 1 raz dziennie

Wskazania: Leczenie grzybic

Rp.

Acidi lactici	0,03
Vitami E puri	0,04
Witepsoli	q.s.
M.f.globul.vaginal.	D.t.d. N° 24

D.S. 1 globulkę na noc

Wskazania: Działanie regenerująco-odżywcze, po kuracji antybiotykowej (Kurację można powtórzyć)

Rp.

Progesteroni	0,2
Sildenafilici citrici	0,035
Witepsoli	q.s.
M.f.globul.vaginal.	D.t.d. N° 24

D.S. ściśle wg wskazówek lekarza prowadzącego

Wskazania: W celu pogrugenia endometrium przed planowanym zapłodnieniem *in vitro*

Rp.

Vit. A	10 000 j.m.
Glyceroli 85%	0,1
Witepsoli	q.s.
M.f.globul.vaginal.	D.t.d. N° 24

D.S. 1 globulkę na noc

Wskazania: Działanie odżywczo-regenerujące np. po kuracji antybiotykowej, w marskości

Rp. Pełnopłatna

Clindamycini	0,075 (do 0,3)
Acidi borici	0,03
Witepsoli	q.s.
M.f.globul.vaginal.	D.t.d. N° 12

D.S. 1 raz co 12 godz., lub 1 raz co 24 godz. (wg wskazań lekarza)

Wskazania: Stany bakteryjne reagujące na klindamycynę

Rp.

Clotrimazoli	0,2
Acidi lactici	0,01
Witepsoli	q.s.
M.f.globul.vaginal.	D.t.d. N° 12

D.S. 2 razy dziennie 1 globulkę przez 3 dni lub 1 globulkę na noc przez 6 dni

Wskazania: Zakażenia pochwy i sromu wywołane przez drożdżaki, w tym zakażenia nie poddające się leczeniu nystatyną

Rp.

Progesteroni	od 0,05 do 0,2 (wyjątkowo do 0,6)
Witepsoli	q.s.
M.f.globul.vaginal.	D.t.d. No 24

D.S. ściśle wg wskazań lekarza ordynującego

Wskazania: Zakres dawki uzależniony od jednostek chorobowych w których progesteron w postaci dopochwowej jest podawany:

- Stany niedoboru endogennego progesteronu (zaburzenia cyklu miesiączkowego, bolesne miesiączki, cykle bezowulacyjne, zespół napięcia miesiączkowego, czynnościowe krwawienia maciczne).
- Endometrioza, przygotowanie do zapłodnienia *in vitro*. Niepłodność związana z niedomogą lutelaną, poronienia nawykowe i zagrażające na tle niedoboru progesteronu, niewydolność fazy lutealnej okresu przedmenopauzalnego, hormonalna terapia zastępcza.



Actifarm sp. z o.o.

Ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa
Tel.: +48 22 212 89 89
Fax: +48 22 212 87 16
E-mail: biuro@actifarm.pl

Oddział Kraków
ul. Bociana 22a
31-231 Kraków

www.actifarm.pl