



Informacja dla lekarza

W materiale przedstawiono kilka złożonych zestawień składów, przydatnych w leczeniu schorzeń proktologicznych.

Specyficzne, intymne potrzeby pacjentów ze schorzeniami proktologicznymi wymagają elementarnego potraktowania każdego przypadku chorobowego.

Lek recepturowy, dopasowany do objawów podmiotowych jest celowanym postępowaniem terapeutycznym. W materiale przedstawiono egzemplifikacje preparatów, do wykorzystania przez lekarza praktyka w hemoroidach krwawiących, niekrwawiących [świeżych, przewlekłych], z towarzyszącym świądem (*pruritus ani*) oraz trudnej do leczenia jednostki chorobowej szczeliny odbytu (*fissura ani*).

Recepturowe leki proktologiczne

Rp. Czopki na hemoroidy ze stanem bakteryjnym

Bismuthi subgallici	0,1
Neomycini sulfatis	0,25
Zinci sulfurici	0,02
Witepsoli	q.s.
M.f.suppos.rectal.	D.t.d. N° 24

D.S. 1 do 2 razy dziennie
1 czopek doodbytniczo

Rp. Czopki na hemoroidy bolesne

Bismuthi subgallici	0,3
Resorcini	0,05
Acidi borici	0,1
Tetracaini hydrochlorici	0,025
Witepsoli	q.s.
M.f.suppos.rectal.	D.t.d. N° 24

D.S. 1 do 2 razy dziennie
1 czopek doodbytniczo

Rp. Czopki na hemoroidy ze stanem zapalnym, świądem i bólem

Bismuthi subcarbonici	0,5
Ichthyoli	0,05
Prednisoloni	0,015
Procaini hydrochlorici	0,2
Witepsoli	q.s.
M.f.suppos.rectal.	D.t.d. N° 24

D.S. 1 do 2 razy dziennie
1 czopek doodbytniczo

Rp. Czopki na hemoroidy przewlekłe, zadawnione, nawracające

Bismuthi subnitrici	0,4
Zinci oxydati	0,15
Tetracaini hydrochlorici	0,025
Lanolini	
Paraffini liquidi	aa 0,04
Witepsoli	q.s.
M.f.suppos.rectal.	D.t.d. N° 24

D.S. 1 do 2 razy dziennie
1 czopek doodbytniczo

Rp. Czopki na hemoroidy o łagodniejszym obrazie, bez świądu i bólu

Zinci oxydati	0,05
Bismuthi subnitrici	0,5
Paraffini liquidi	q.s.
Witepsoli	q.s.
M.f.suppos.rectal.	D.t.d. N° 24

D.S. 1 - 2 razy czopek doodbytniczo

Rp. Czopki o działaniu ściągającym

Tannini	0,1
Aqua purificatae	q.s.
Intracti Hippocastani	gtt. 3
Benzocaini	0,3
Witepsoli	q.s.
M.f.suppos.rectal.	D.t.d. N° 24

D.S. 1 do 2 razy dziennie
1 czopek doodbytniczo

**Czopki na przewlekłe hemoroidy,
czopki osłaniająco-kojące**

***Rp.**

Lignocaini hydrochlorici	0,15
Balsam Szostakowskiego	0,4
Witepsoli	q.s.
M.f.suppos.rectal.	D.t.d. N° 24

D.S. 1 do 2 razy dziennie
1 czopek doodbytniczo

Preparat nadaje się do długotrwałego stosowania.

***Recepta pełnopłatna**

**Maść ściągająco-przeciwzapalna
ze środkiem znieczulającym**

Rp.

Bismuthi subnitrici	20,0
Tannini	3,0
Ol. Lini	7,0
Tetracaini hydrochlorici	1,5
Lanolini	
Pastae Zinci	aa ad 100,0
M.f.ung.	

D.S. 1-3 razy dziennie smarować
okolice zmienione chorobowo

**Czopki na ropne,
bakteryjne choroby odbytu**

Rp.

Detreomycini	0,2
Witepsoli	q.s.
M.f.suppos.rectal.	D.t.d. N° 12

D.S. jeden czopek co 12 godzin

**Maść na stany zapalne okolic
odbytu z towarzyszącym świądem**

Rp.

Hydrocortisoni	
Benzocaini	aa 0,5
Zinci oxydati	2,0
Eucerini	
Vaselini albi	aa ad 50,0
M.f.ung.	

D.S. 1 - 2 razy dziennie

Kremożel o działaniu znieczulającym

Rp.

Lidocaini hydrochlorici	2,0
Cholesteroli	2,5
Aquae purificatae	30,0
Oleogeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

D.S. Zewn. 1 - 2 razy dziennie

**Maść na stany zapalne okolic
odbytu, bez nasilonego bólu i świądu**

Rp.

Bismuthi subcarbonici	18,0
Ol. Lini	6,0
Vaselini flavi	ad 100,0
M.f.ung.	

D.S. 1 - 3 razy dziennie

Recepturowe leki proktologiczne

*Rp. Hydrożel na szczelinę odbytu

Diltiazemi hydrochlorici 2,5
Celugeli ad 100,0
M.f.gelatum

D.S. np. 1 raz dziennie

Preparat przeznaczony do długotrwałej terapii. Maść z diltazemem jest wykonywana z leku gotowego (*Dilzem lub Oxycardil*). Dotychczas przepisywana była na wazelinie. Zdecydowanie lepiej penetrujący będzie Celugel.

***Recepta pełnopłatna**

*Rp. Oleożel na szczelinę odbytu

Nitrocard 2% ung. 25,0
Vitamini E 3,0
Oleogeli ad 100,0
M.f.gelatum

D.S. np. 1 raz dziennie

Preparat przeznaczony do leczenia stanów zaostżeń, w krótkotrwałej terapii.

***Recepta pełnopłatna**

Rp. Żel do miejscowego stosowania

Procaini hydrochlorici 1,0
Aquae
Intracti Hippocastani aa 16,0
Celugeli ad 200,0
M.f.gelatum

D.S. smarować 2-5 razy dziennie

Wskazania: Żel do miejscowego stosowania w dolegliwościach związanych z hemoroidami i innymi stanami chorobowymi odbytu, przebiegających ze świądem, bólem.

Rp. Czopki z metronidazolem

Metronidazoli 0,5-1,0
Witepsoli q.s.
M.f.suppr.rectal. D.t.d. N° 24

D.S. wg wskazań proktologa

Rp. Proktologiczny żel ściągający

Intracti Hippocastani 20,0
Celugeli ad 200,0
M.f.gelatum

D.S. 1-3 razy dziennie