

## Recepturowe leki ginekologiczne

### Rp.

Vit. A 10 000 j.m.  
Glyceroli 85% 0,1  
Witepsoli q.s.  
M.f.globul.vaginal. D.t.d. N° 24

D.S. 1 globulkę na noc

**Wskazania: Działanie odżywczo-regenerujące np. po kuracji antybiotykowej, w marskości**

### Rp.

Linomag liq. 5,0  
Vit. E puri 1,0  
Oleogeli ad 100,0  
M.f. gelatum

D.S. 1 x dziennie

**Wskazania: do nawilżania sromu**

### Rp.

Clindamycini hydrochloridi (od) 0,1 (do) 0,3  
Witepsoli q.s.  
M.f.glob.vag. D.t.d. No 12 lub 24

D.S. dopochwowo 1 (lub 2) x dziennie  
1 globulkę

**Wskazania: zakażenia bakteryjne**

### Rp.

Clindamycini hydrochloridi 0,075 (do 0,3)  
Prednisoloni 0,002  
Acidi boric 0,03  
Witepsoli q.s.  
M.f.globul.vaginal. D.t.d. N° 12

D.S. 1 raz co 12 godz., lub 1 raz co 24 godz. (wg wskazań lekarza)

**Wskazania: Stany bakteryjne ze świadem, reagujące na klindamycynę**

### Rp.

Vit. A 100 000 j.m.  
Vit. E puri 0,5  
Azulani liq. 1,0  
Acidi lactici 1,5  
Celugeli ad 100,0  
M.f.gelatum

D.S. 1 - 2 x dziennie

**Wskazania: żel dopochwowy łagodząco-regenerujący**

### Rp.

0,4% sol. Clindamycini hydrochloridi 250,0  
M.f.sol.

D.S. do irygacji pochwy 1 x wieczorem,  
po 20-40 ml

**Wskazania: do irygacji pochwy**

## Recepturowe leki ginekologiczne



### Informacja dla lekarza

#### **W materiale przedstawiono kilka złożonych zestawień składów, przydatnych w praktyce lekarza ginekologa.**

Leki recepturowe uzupełniają armamentarium w stanach chorobowych wymagających doraźnego zastosowania preparatu w zindywidualizowanej dawce bądź stężeniu. Preparaty rekomendowane są w doraźnym leczeniu stanów wymagających szybkiego działania, takich jak zakażenia bakteryjne, grzybicze, pierwotniakowe, stany zapalne.

W podanych przepisach uwzględniono nowoczesne podłoże dostępne w polskiej recepturze do sporządzania czopków i globulek - **Witepsol H15** oraz podłoża żelowe: **Celugel, Oleogel**.

#### **Zaletą leków wykonanych z tym podłożem jest:**

- brak konieczności przechowywania w lodówce (z wyjątkiem preparatów z nystatyną);
- zgodność z substancjami stosowanymi w recepturze;
- dobre wchłanianie (w wyniku emulgowania z płynami jam ciała);
- odporność na jęłczenie;
- wygoda aplikacji.

**Actifarm sp. z o.o.**  
Ul. Zajęcza 15  
00-351 Warszawa  
Tel.: +48 22 212 89 89  
Fax: +48 22 212 87 16  
E-mail: [biuro@actifarm.pl](mailto:biuro@actifarm.pl)

Oddział Kraków  
ul. Bociana 22a  
31-231 Kraków

[www.actifarm.pl](http://www.actifarm.pl)

## Recepturowe leki ginekologiczne

Prezentowane składy leków recepturowych są przykładem możliwości technologicznych postaci leku wykonywanego w zakresie receptury aptecznej. Ostateczną decyzję na temat: składu, stężenia substancji, dawkowania u pacjenta podejmuje lekarz na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia.

### Rp.

Clindamycini hydrochloridi	0,2
Acidi borici	0,06
Metronidazoli	0,5
Witepsoli	q.s.
M.f.glob.vag. D.t.d. No 12 lub 24	

D.S. dopochwowo 1 (lub 2) x dziennie  
1 globulkę

**Wskazania:** zakażenia rzęsistkiem,  
nieswoiste zakażenia pochwy

### Rp.

Gentamycini sulfurici	0,08
Prednisoloni	0,004
Clotrimazoli	0,2
Acidi borici	0,06
Witepsoli	q.s.
M.f.globul.vaginal. D.t.d. N° 12	

D.S. 1 globulkę na noc

**Wskazania:** Mieszane zakażenia  
bakteryjno-grzybicze z towarzyszącym  
świędem

### Rp.

Metronidazoli	0,5 (lub 1,0)
Detreomycini	0,3
Acidi borici	0,1
Sacchari Lactis	0,15
Witepsoli	q.s.
M.f.globul.vaginal. D.t.d. N° 12	

D.S. 1 globulkę na noc

**Wskazania:** Ostre zakażenia  
bakteryjno-pierwotniakowe

### Rp.

Clindamycini hydrochloridi	0,2
Acidi borici	0,04
Sacchari Lactis	0,2
Witepsoli	q.s.
M.f.globul.vaginal. D.t.d. N° 12	

D.S. 1 globulkę na noc

**Wskazania:** Zapalenia bakteryjne reagujące  
na linkozamidy

### Rp.

Vit. E puri	
Dimeticoni	aa 0,04
Glycerini	0,1
Witepsoli	q.s.
M.f.glob.vag. D.t.d. No 12 lub 24	

D.S. dopochwowo 1 (lub 2) x dziennie  
1 globulkę

**Wskazania:** atrofia błony śluzowej pochwy

### Rp.

Acicloviri (ex Heviran)	0,8
Sacchari Lactis	0,2
Vit. A	5000 j.m.
Witepsoli	q.s.
M.f.globul.vaginal. D.t.d. N° 12	

D.S. 1 globulkę na noc

**Wskazania:** Wirusowe zapalenie pochwy  
Pełnopłatna

### Rp.

Nystatini	10 mln j.m.
Glyceroli 85%	
Acidi lactici	aa 5,0
Celugeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

D.S. 1 raz na noc

**Wskazania:** leczenie zakażeń grzybiczych

### Rp.

Neomycini sulfurici	0,25
Nystatini	200 000 j.m.
Acidi lactici	0,01
Witepsoli	q.s.
M.f.globul.vaginal. D.t.d. N° 12	

D.S. 1 globulkę na noc

**Wskazania:** Mieszane zakażenia  
bakteryjno-grzybicze

### Rp.

Clotrimazoli	2,0
Benzocaini	1,0
Glyceroli 85%	3,0
Celugeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

D.S. 1-2 razy dziennie

**Wskazania:** Leczenie stanów  
drożdżakowych z towarzyszącym świędem

### Rp.

Cupri sulfurici	0,3
Aquae purificatae	1,5
Celugeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

D.S. 1 raz dziennie

**Wskazania:** Leczenie grzybic

### Rp.

Acidi lactici	0,03
Vit. E puri	0,04
Witepsoli	q.s.
M.f.globul.vaginal. D.t.d. N° 24	

D.S. 1 globulkę na noc

**Wskazania:** Działanie  
regenerująco-odżywcze, po kuracji  
antybiotykowej (Kurację można powtórzyć)

### Rp.

Progesteroni	0,2
Sildenafilu citrici	0,035
Witepsoli	q.s.
M.f.globul.vaginal. D.t.d. N° 24	

D.S. ściśle wg wskazówek lekarza  
prowadzącego

**Wskazania:** W celu pogrubienia  
endometrium przed planowanym  
zapłodnieniem *in vitro*