

Leki recepturowe w rekonwalescencji po radioterapii



Radioterapia to jedna z kluczowych metod leczenia nowotworów. Może być stosowana zarówno jako terapia podstawowa oraz jako leczenie uzupełniające.

Pomimo swojej wysokiej skuteczności, radioterapia może wiązać się z działaniami niepożądanymi, które mogą znacząco wpływać na jakość życia pacjentów. Dzięki lekom recepturowym można zindywidualizować terapię poprzez dokładne dobranie składników i dawek substancji czynnych i pomocniczych co będzie skutkowało skuteczniejszym powrotem do zdrowia pacjentów.

Leki recepturowe w rekonwalescencji po radioterapii

Przykładowe receptury

Żel przeciwbólowy z morfiną

Rp.

Morphini hydrochloridi	4,0
Ol. Menthae pip.	0,1
Celugeli	ad 200,0
M.f. gelatum	

D.S. 3x5 g żelu

Łącznie: cztery gramy chlorowodoru morfiny

Do stosowania przy poważniejszych podrażnieniach skóry po radioterapii

Rp.

Tannini	3,0
Aquae purificatae	8,0
Bismuthi subcarbonici	20,0
Lanolini	
Oleogeli	aa ad 100,0
M.f.ung.	

D.S. 2-3 x dziennie

P/bólowo w nowotworach jamy ustnej

Rp.

Azulani	3,0
Vit. A liq	60 000 I.U.
Vit. E puri	0,5
Tetracaini hydrochloridi	0,2
Celugeli	ad 200,0
M.f. gelatum	

D.S. 4-5x dziennie

P/bólowo w nowotworach jamy ustnej ze zmianami drożdżakowymi

Rp.

Nystatini	3,0
Tetracaini hydrochloridi	0,2
Azulani	5,0
Celugeli	ad 100,0
M.f. gelatum	

D.S. 2x dziennie

Suchość jamy ustnej

Rp.

Acidi tartarici	0,4
Natrii citrici	0,2
Acidi citrici	0,35
Aquae purificatae	9,0
Celugeli	ad 50,0
M.f. gelatum	

D.S. żel nawilżająco-regenerujący do stosowania w jamie ustnej, 2-4 x dziennie

Bolesne kandydozy jamy ustnej

Rp.

Nystatini	3 mln j.m.
Benzocaini	1,2
Natrii tetraborici	
Glyceroli 85%	aa 2,0
Celugeli	ad 30,0
M.f. gelatum	

D.S. żel do stosowania w jamie ustnej, co 4-6 godz.

Prezentowane składy leków recepturowych są przykładem możliwości technologicznych postaci leku wykonywanego w zakresie receptury aptecznej. Ostateczną decyzję na temat: składu, stężenia substancji, dawkowania u pacjenta podejmuje lekarz na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia.

Świąd skóry po chemioterapii

Rp.

Procaini hydrochloridi	8,0
Acidi tartarici	5,0
Chlorali hydrati	0,6
Mentholi	0,8
Glyceroli 85%	10,0
60% Spir. Vini	ad 200,0
M.f.solutio	

D.S. 3 - 4 x dziennie

Rumień po radioterapii

Rp.

Benzocaini	5,0
Hydrocortisoni	0,5
Glyceroli 85%	2,5
Celugeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

D.S. 1 do 3 x dziennie

Odżywienie skóry podrażnionej po radioterapii

Rp.

Vit. A li	500 000 j.m.
Vit. E puri	5,0
Linomagi liquidi	8,0
Oleogeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

D.S. 2 x dziennie

Odżywczy żel do pielęgnacji skóry po radioterapii

Rp.

Vit. A + D3	3,0
Vit. E puri	2,0
Oleogeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

D.S. 2-3 x dziennie

Ginekologiczny żel regenerujący

Rp.

Linomagi liq.	5,0
Vit. E puri	1,0
Oleogeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

D.S. 1 x dziennie

Atrofia błony śluzowej pochwy

Rp.

Vit. E puri	
Dimeticoni	aa 0,04
Glyceroli 85%	0,1
Witepsoli q.s.	q.s.
M.f.glob.vag	D.t.d. No 12 lub 24

D.S. 1 (lub 2) x dziennie, dopochwowo

PODŁOŻA ŻELOWE

Actifarm®

Celugel

» Nowoczesne podłoże hydrożelowe, charakteryzujące się unikalnymi właściwościami bioadhezyjnymi względem błon śluzowych. Z powodzeniem może być zastosowane jako vehiculum dla leków do stosowania w jamie ustnej, nosogardzieli, nabłonka migawkowego (w powikłaniach po radioterapii tych obszarów).



Oleogel

» Delikatne podłoże lipofilowe, będące żelem hydrofobowym. Rekomendowane jest jako vehiculum półstałych postaci leków dermatologicznych. Szczególne zastosowanie znajduje w leczeniu chorób skórnych przebiegających z przesuszeniem i szorstkością, które są pierwszymi objawami uszkodzeń skóry po radioterapii.



Podmiot odpowiedzialny:


Actifarm®
receptura+

Actifarm sp. z o.o.
Ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa
Tel.: +48 22 212 89 89

Oddział Kraków
ul. Bociana 22a
31-231 Kraków

Dział sprzedaży:
m: +48 513 463 570
fax: +48 22 212 87 16
zamowienia@actifarm.pl
biuro@actifarm.pl

www.actifarm.pl

Obserwuj nas
 **actifarm**