

Celugel®

Surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania leków recepturowych i aptecznych. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu **30050**


Actifarm®
receptura+



JEDYNE RECEPTUROWE PODŁOŻE W POSTACI HYDROŻELU

Celugel® to podłoże hydrofilowe zawierające dużą ilość wody, glicerol oraz substancję żelującą: hydroksyetylocelulozę (HEC 10 000).

Właściwości: przezroczysty żel o prawie niewyczuwalnym zapachu, jego pH wynosi 4,5 - 6,0.

Dostępna gramatura: 100 g

Nr BLOZ: **3643917**

Celugel® jest surowcem farmaceutycznym przeznaczonym do sporządzania leków recepturowych i aptecznych, które są refundowane na zasadach ogólnych dotyczących refundacji leków recepturowych.

www.actifarm.pl

Celugel® Surowiec farmaceutyczny

Przykładowe recepty:

Rp. Zaburzenia rogowacenia

Ureae purae	10,0 – 40,0
Acidi lactici	4,0
Celugeli	ad 100,0
M.f. gelatum	

D.S. 1 x dziennie na noc

Dodatkowe wskazania: **Rybia łuska, łupież czerwony mieszkowy**

Sposób wykonania:

Mocznik rozpuścić w Celugelu używając moździerza lub za pomocą bagietki (proces długotrwały) bądź przy użyciu miksera recepturowego (na najmniejszych "1" obrotach) następnie dodać kwas mlekowy.

Rp. Trądzik

Detreomycini	1,0 – 3,0
60% Ethanolu	20,0
Celugeli	ad 100,0
M.f. gelatum	

D.S. 1 x dziennie na noc

Dodatkowe wskazania: **Ropne zakażenia skóry wrażliwe na chloramfenikol**

Sposób wykonania:

Chloramfenikol rozpuścić w 60% etanolu, a następnie wprowadzić do Celugelu używając moździerza lub za pomocą bagietki (proces długotrwały) bądź przy użyciu miksera recepturowego (na najmniejszych "1" obrotach). Sporządzony preparat jest nieprzezroczysty, barwy białej lub biało-żółtawej.

Rp. Alergie i świąd

Benzocaini	5,0
Prednisoloni	0,25
Glyceroli 85%	2,5
Celugeli	ad 100,0
M.f. gelatum	

D.S. 1 do 3 x dziennie

Dodatkowe wskazania: **Ostry i przewlekły wysięk alergiczny z towarzyszącym świądem**

Sposób wykonania:

Zmikronizowaną benzokainę oraz prednizolon zlewigować glicerolem 85% i wprowadzić do Celugelu używając moździerza lub za pomocą bagietki (proces długotrwały) bądź przy użyciu miksera recepturowego (na najmniejszych "1" obrotach).

Rp. Trądzik zakażony

Clindamycini hydrochloridi	0,5
Vit. E puri	1,0
Celugeli	ad 50,0
M.f. gelatum	

D.S. 1 x dziennie

Sposób wykonania:

Klindamycynę i wit. E wprowadzić bezpośrednio do Celugelu.

Rp. Trądzik

Clindamycini hydrochloridi 1,0
Aquae purificatae 10,0
Celugeli ad 100,0
M.f. gelatum

D.S. 2 x dziennie

Sposób wykonania:

Klindamycyny chlorowodorek rozpuścić w wodzie. Wprowadzić roztwór do Celugelu używając miksera recepturowego, moździerz lub za pomocą bagietki.

Rp. Nużyca

Metronidazoli 0,5
3% sol. Acidi borici 20,0
Celugeli ad 100,0
M.f. gelatum

D.S. 1 x na noc

Sposób wykonania:

Metronidazol oraz 0,6 g kwasu borowego rozpuścić w gorącej wodzie. Wprowadzić ciepły roztwór do Celugelu używając miksera recepturowego, moździerz lub za pomocą bagietki.

Rp. Obrzęki

Liq. Burovi 40,0
Celugeli ad 200,0
M.f. gelatum

D.S. 2 - 4 x dziennie

Dodatkowe wskazania: Tępe urazy bez przerwania powłok skóry, skręcenia, nadwyżężenia i naderwanie ścięgien, stany zapalne z nadmiernym uciepleniem skóry

Sposób wykonania:

Płyn Burowa zmieszać z Celugelem za pomocą bagietki lub miksera recepturowego.

Rp. Żel dopochwowy

Clindamycini hydrochloridi 1,0
Celugeli ad 100,0
M.f. gelatum

D.S. 1 x dziennie 5g

**Dodatkowe wskazania:
Ginekologiczne zakażenia
bakteryjne**

Sposób wykonania:

Klindamycyny chlorowodorek wprowadzić bezpośrednio do Celugelu używając miksera recepturowego, moździerz lub za pomocą bagietki.

Prezentowane składy leków recepturowych są przykładem możliwości technologicznych postaci leku wykonywanego w zakresie receptury aptecznej. Ostateczną decyzję na temat: składu, stężenia substancji, dawkowania u pacjenta - podejmuje lekarz na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia.

Celugel®

Surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania leków recepturowych i aptecznych. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu **30050**

Zastosowanie Celugelu wskazane jest w leczeniu: oparzeń, zmian wysiękowych, trądziku, skóry owłosionej. Na skórze po wyschnięciu powstaje cienka, przepuszczalna ochronna błonka.

Zalety preparatów wykonanych z użyciem Celugelu:

- lekkie, nietłuste, przyjemne po naniesieniu, wygodne przy aplikacji,
- łatwo zmywalne z powierzchni skóry,
- zapewnia odczucie chłodzenia** skóry i nabłonka zmienionych zapalnie, z towarzyszącymi objawami podmiotowymi: zaczerwienieniem, obrzękiem, uciepleniem,
- alternatywa przy złej tolerancji podłoży lipofilowych,
- pH zbliżone do odczynu fizjologicznego skóry** zapewnia zachowanie kwasowo-alkalicznej równowagi tkanek,
- zawiera glicerol, który zapobiega natychmiastowemu wysychaniu,
- nie zawiera etanolu, ale jest możliwe jego wprowadzenie,
- wykonany preparat może mieć termin przydatności do użycia **do 30 dni** z uwagi na zawarte w podłożu: kwas sorbinowy i sorbinian potasu. Środki te w przeciwieństwie do parabenów wykazują zminimalizowany potencjał alergizujący.

- ! Celugel nie powinien stanowić *vehiculum* preparatów dla skóry przesuszonej, szorstkiej oraz pergaminowatej.
- ! Wszystkie preparaty z zastosowaniem Celugelu zaleca się przechowywać w chłodnym miejscu (2-8°C).
- ! Jeżeli preparat wykonywany jest w mikserze recepturowym należy zadbać o jego odpowietrzenie.

Podmiot odpowiedzialny:


Actifarm
receptura+

Actifarm sp. z o.o.
Ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa
Tel.: +48 22 212 89 89

Oddział Kraków
ul. Bociana 22a
31-231 Kraków

Dział sprzedaży:
m: +48 513 463 570
fax: +48 22 212 87 16
zamowienia@actifarm.pl
biuro@actifarm.pl

www.actifarm.pl

Obserwuj nas

