



NOWOCZESNA RECEPTURA W CODZIENNEJ PRAKTYCE LEKARSKIEJ

Leki recepturowe to możliwość **indywidualnego podejścia do terapii każdego dziecka**. Umożliwiają precyzyjne dostosowanie dawki do wieku i masy ciała pacjenta, a także dobór odpowiedniej postaci – np. zawiesiny, maści czy czopka – gdy gotowe preparaty nie są dostępne.

Dzięki przygotowaniu leku w aptece można wyeliminować zbędne substancje pomocnicze, takie jak konserwanty, barwniki, alkohol czy laktoza, co zwiększa bezpieczeństwo i tolerancję leczenia.

Receptura apteczna pozwala również **łączyć kilka substancji czynnych w jednej postaci**, ułatwiając terapię i poprawiając współpracę małego pacjenta.

To rozwiązanie, które łączy **skuteczność, bezpieczeństwo i elastyczność**, a w wielu przypadkach okazuje się także **ekonomicznie korzystne**.

- ⊕ **Indywidualna terapia dla najmłodszych** – siła leków recepturowych
- ⊕ **Bez konserwantów, bez kompromisów** – tylko to, czego potrzebuje dziecko
- ⊕ **Tam, gdzie gotowy lek nie wystarcza** – receptura daje rozwiązanie

PRECYZYJNA DAWKA. BEZPIECZNY SKŁAD. SKUTECZNA TERAPIA.

Zawiesiny i preparaty doustne

– kiedy gotowy lek to za mało

Zawiesina z oseltamiwirem 30 mg / 5 ml

Rp.

Oseltamiviri ex caps. vel tbl. 0,3
Oralbaza 50 ml
M.f.susp.

D.S. Zmieszać przed użyciem co 12 godz.
5 ml (30 mg oseltamiwiru)

Recepta pełnopłatna

Zawiesina z omeprazolem 10 mg / 5 ml (z surowca do rec.)

Rp.

Omeprazoli 0,14
Natrii bicarbonici 2,94
Oralbaza 70 ml
M.f.susp.

D.S. Zmieszać przed użyciem 1 x dziennie
rano 5 ml, 30 min. przed śniadaniem.
14 dni kuracji

Mieszanka z klindamycyną 75 mg / 5 ml

Rp.

Clindamycini hydrochlorici 1,2
Oralbaza 80 ml
M.f.mixt.

D.S. ściśle wg wskazań lekarza
(dawkowanie dostosowane do stanu
klinicznego, wieku i masy ciała)

Mieszanka z syldenafilem 0,5 mg / ml (wskazania kardiologiczne)

Rp.

Sildenafil citrici 0,045
Oralbaza 90 ml
M.f.mixt.

D.S. 1 x dziennie 3 ml
(1,5 mg cytrynianu syldenafilu)

Zawiesina z propranololem 5 mg / 5 ml

Rp.

Propranololi hydrochlorici ex tbl. 0,1
Oralbaza 100 ml
M.f.susp.

D.S. 1 x dziennie 5 ml
(5 mg chlorowodorku propranololu)

Wsk.: m.in. leczenie nadciśniaków niemowlęcych

Mieszanka z furosemidem 5 mg / 10 ml

Rp.

Furosemidi ex amp. No 3 amp.
20 mg/2 ml 114 ml
Oralbaza
M.f.mixt.

D.S. 1 x dz. 5 ml (2,5 mg furosemidu)

**W przypadku furosemidu korzystniej z punktu
bio-farmaceutycznego (wchłanianie) jest
przyrządzać mieszanę (w postaci rozpuszczonej)
– z użyciem ampulek niż zawiesinę – z tabletek**



Nowoczesne hydrożele

– delikatność i skuteczność w jednym



Żel na kandydozy jamy ustnej, pleśniawki, zajady

Rp.

Nystatini	3 mIn j.m.
Anaesthesini (Benzocaini)	1,2
85% Glycerini	2,0
Celugeli	ad 30,0
M.f.gelatum	

D.S. Do stosowania w jamie ustnej i kąciach ust, kilka razy dziennie

Rp. Nieżyt nosa

Ephedrini hydrochlorici	0,2
Aquae purificatae	1,0
Ol. Menthae pip.	gtt. No 1
Celugeli	ad 20,0
M.f.gelatum	

D.S. laryngologiczny żel do nosa, smarować 2-4 x dziennie

Hydrożel – na trądzik młodzieńczy (niezawierający alkoholu)

Rp.

Clindamycini hydrochlorici	1,0
Celugeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

D.S. 2 x dziennie

Hydrożel - na trądzik młodzieńczy (z alkoholem, na duże powierzchnie skóry)

Rp.

Detreomycini	1,0 – 3,0
60% Ethanolu	20,0
Celugeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

D.S. 1 x dziennie na noc

Hydrożel – w leczeniu zewnętrznym naczynek (haemangioma) u niemowląt.

Rp.

Timololi maleinici	0,5
Celugeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

D.S. 3-4 x dziennie

Czopki z metamizolem (pyralginą) - wysokie gorączki [w razie nieskuteczności paracetamolu, ibuprofenu, naproksenu]

Rp.

Pyralgini	0,4
Witepsoli	q.s.
M.f.suppl.anal.	d.t.d. No 12

D.S. w razie gorączki, powyżej 39°C
1 czopek doodbytniczo co 6 godzin.

*** jednorazowa dawka metamizolu u dzieci do 14 r.ż. wynosi 16 mg/kg masy ciała w odstępach co 6 godzin. W podanym przykładzie podano dawkę dla dziecka 8-letniego o masie ciała 25 kg**

Regeneracja zaczyna się od właściwej formuły

Rp. Pieluszkowe zapalenie skóry

Bismuthi subcarbonici	20,0
Linomag liquidi	12,0
Aquae purificatae	16,0
Cholesteroli	2,0
Oleogeli	aa ad 100,0
M.f.ung.	

D.S. 2 x dziennie

Rp. Atopowe zapalenie skóry

Vit. E puri	
Cholesteroli	
85% Glycerini	aa 2,0
Aquae purificatae	30,0
Oleogeli	ad 100,0
M.f.cremor	

D.S. 1 - 3 x dziennie

Rp. Krem cholesterolowo (4%) - mocznikowy (0,5%) długotrwale nawilżający, ochronny, łagodzący

Ureae	0,5
Cholesteroli	4,0
Aquae purificatae	35,0
Oleogeli	ad 100,0
M.f. cremor	

D.S. 1 do 2 x dziennie

Rp. Maść garbnikowa – odparzenia skóry w okolicach odbytu u niemowląt, stany przebiegające z maceracją, pieczeniem.

Tannini	1,0
Aquae purificatae	3,0
Cholesteroli	2,0
Pastae Zinci	
Oleogeli	aa ad 100,0
M.f.ung.	

D.S. 2 x dziennie

Rp. Oleożel z hydrokortyzonem – na stany zapalne pochodzenia alergicznego z towarzyszącym świądem

Hydrocortisoni	1,0 – 2,5
Oleogeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

D.S. 1-2 x dziennie

Rp. Maść witaminowa, odżywienie skóry

Vit. A	500 000 j.m.
Vit. E puri	3,0
Linomag liquidi	8,0
Oleogeli	ad 100,0
M.f. gelatum	

D.S. 2-3 x dziennie

Podmiot odpowiedzialny:


Actifarm®
receptura+

Actifarm sp. z o.o.
Ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa
Tel.: +48 22 212 89 89

Oddział Kraków
ul. Bociana 22a
31-231 Kraków

Dział sprzedaży:
m: +48 513 463 570
fax: + 48 22 212 87 16
zamowienia@actifarm.pl
biuro@actifarm.pl

www.actifarm.pl

Obserwuj nas
 **actifarm**