

Leki recepturowe w rekonwalescencji po radioterapii



Radioterapia to jedna z kluczowych metod leczenia nowotworów. Może być stosowana zarówno jako terapia podstawowa oraz jako leczenie uzupełniające.

Pomimo swojej wysokiej skuteczności, radioterapia może wiązać się z działaniami niepożądanymi, które mogą znacząco wpływać na jakość życia pacjentów. Dzięki lekom recepturowym można zindywidualizować terapię poprzez dokładne dobranie składników i dawek substancji czynnych i pomocniczych co będzie skutkowało skuteczniejszym powrotem do zdrowia pacjentów.

Leki recepturowe w rekonwalescencji po radioterapii

Przykładowe receptury

Odżywienie skóry podrażnionej po radioterapii

Rp.

Vit. A	500 000 j.m.
Vit. E puri	5,0
Linomagi liq.	8,0
Oleogeli	ad 100,0
M.f. gelatum	

D.S. 2 x dziennie

Do stosowania przy poważniejszych podrażnieniach skóry po radioterapii

Rp.

Tannini	3,0
Aquae purificatae	8,0
Bismuthi subcarbonici	20,0
Lanolini	
Oleogeli	aa ad 100,0
M.f.ung.	

D.S. 2-3 x dziennie

P/bólowo w nowotworach jamy ustnej

Rp.

Azulani	3,0
Vit. A	60 000 I.U.
Vit. E puri	0,5
Tetracaini hydrochloridi	0,2
Celugeli	ad 200,0
M.f. gelatum	

D.S. 4-5 x dziennie

P/bólowo w nowotworach jamy ustnej ze zmianami drożdżakowymi

Rp.

Nystatini	3,0
Tetracaini hydrochloridi	0,2
Azulani	5,0
Celugeli	ad 100,0
M.f. gelatum	

D.S. 2 x dziennie

Suchość jamy ustnej

Rp.

Acidi tartarici	0,4
Natrii citrici	0,2
Acidi citrici	0,35
Aquae purificatae	9,0
Celugeli	ad 50,0
M.f. gelatum	

D.S. żel nawilżająco-regenerujący do stosowania w jamie ustnej, 2-4 x dziennie

Bolesne kandydozy jamy ustnej

Rp.

Nystatini	3 mln j.m.
Benzocaini	1,2
Natrii tetraborici	
Glyceroli 85%	aa 2,0
Celugeli	ad 30,0
M.f. gelatum	

D.S. żel do stosowania w jamie ustnej, co 4-6 godz.

Prezentowane składy leków recepturowych są przykładem możliwości technologicznych postaci leku wykonywanego w zakresie receptury aptecznej. Ostateczną decyzję na temat: składu, stężenia substancji, dawkowania u pacjenta podejmuje lekarz na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia.

Świąd skóry po chemioterapii

Rp.

Procaini hydrochloridi	8,0
Acidi tartarici	5,0
Chlorali hydrati	0,6
Mentholi	0,8
Glyceroli 85%	10,0
60% Spir. Vini	ad 200,0
M.f.solutio	

D.S. 3-4 x dziennie

Rumień po radioterapii

Rp.

Benzocaini	5,0
Hydrocortisoni	0,5
Glyceroli 85%	2,5
Celugeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

D.S. 1-3 x dziennie

Żel przeciwbólowy z morfiną

Rp.w.

Morphini hydrochloridi	4,0
Ol. Menthae pip.	0,1
Celugeli	ad 200,0
M.f. gelatum	

D.S. 3 x 5 g żelu

Łącznie: cztery gramy chlorowodorku morfiny

Odżywczy żel do pielęgnacji skóry po radioterapii

Rp.

Vit. D3	3,0
Vit. E puri	2,0
Oleogeli	ad 100,0
M.f. gelatum	

D.S. 2-3 x dziennie

Ginekologiczny żel regenerujący

Rp.

Linomagi liq.	5,0
Vit. E puri	1,0
Oleogeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

D.S. 1 x dziennie

Atrofia błony śluzowej pochwy

Rp.

Vit. E puri	
Dimeticoni	aa 0,04
Glyceroli 85%	0,1
Witepsoli q.s.	q.s.
M.f. glob.vag	D.t.d. No 12 lub 24

D.S. 1 (lub 2) x dziennie, dopochwowo

PODŁOŻA ŻELOWE

Actifarm®

Celugel

» Nowoczesne podłoże hydrożelowe, charakteryzujące się unikalnymi właściwościami bioadhezyjnymi względem błon śluzowych. Z powodzeniem może być zastosowane jako vehiculum dla leków do stosowania w jamie ustnej, nosogardzieli, nabłonka migawkowego (w powikłaniach po radioterapii tych obszarów).



Oleogel

» Delikatne podłoże lipofilowe, będące żelem hydrofobowym. Rekomendowane jest jako vehiculum półstałych postaci leków dermatologicznych. Szczególne zastosowanie znajduje w leczeniu chorób skórnych przebiegających z przesuszeniem i szorstkością, które są pierwszymi objawami uszkodzeń skóry po radioterapii.



Podmiot odpowiedzialny:


Actifarm®
receptura+

Actifarm sp. z o.o.
Ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa
Tel.: +48 22 212 89 89

Oddział Kraków
ul. Bociana 22a
31-231 Kraków

Dział sprzedaży:
m: +48 513 463 570
fax: + 48 22 212 87 16
zamowienia@actifarm.pl
biuro@actifarm.pl

www.actifarm.pl

Obserwuj nas

