

Leki recepturowe w opiece paliatywnej



Opieka paliatywna jest ważnym elementem współczesnej medycyny, oferując wszechstronne wsparcie pacjentom i ich rodzinom w najtrudniejszych momentach życia. Jej rozwój i integracja z innymi formami opieki medycznej są kluczowe dla poprawy jakości życia osób cierpiących na przewlekłe i nieuleczalne choroby.

Współczesna medycyna kładzie coraz mocniejszy nacisk na spersonalizowane podejście terapeutyczne, w którym leki recepturowe odgrywają kluczową rolę. Dzięki nim możliwe jest dostosowanie terapii do unikalnych potrzeb każdego pacjenta, uwzględniając jego stan zdrowia, preferencje oraz reakcje organizmu na poszczególne substancje czynne.

Poniżej przedstawiono przykładowe składy leków recepturowych, które są możliwe do wykorzystania przez lekarza w ramach opieki nad pacjentem.

Rp.

Krem przeciwświądowy

Camphorae	1,0
Mentholi	2,0
Chlorali hydrati	3,0
Lekobasae	ad 100,0
M.f. ung	

D.S. 1-3 x dziennie

Rpw.

Żel przeciwbólowy z morfiną

Morphini hydrochloridi	4,0
Ol. Menthae pip.	0,1
Celugeli	ad 200,0
M.f. gelatum	

D.S. 3x5g żelu
Łącznie: cztery gramy chlorowodorku morfiny

Leki recepturowe w opiece paliatywnej

Prezentowane składy leków recepturowych są przykładem możliwości technologicznych postaci leku wykonywanego w zakresie receptury aptecznej. Ostateczną decyzję na temat: składu, stężenia substancji, dawkowania u pacjenta podejmuje lekarz na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia.

Przykładowe receptury

P/bólowo w nowotworach jamy ustnej

Rp.

Azulani	3,0
Vit. A	60 000 I.U.
Vit. E	0,5
Tetracaini hydrochloridi	0,2
Celugeli	ad 200,0
M.f. gelatum	

D.S. 4-5x dziennie

P/bólowo w nowotworach jamy ustnej ze zmianami drożdżakowymi

Rp.

Nystatini	3,0
Tetracaini hydrochloridi	0,2
Azulani	5,0
Celugeli	ad 100,0
M.f. gelatum	

D.S. 2x dziennie

Suchość jamy ustnej

Rp.

Acidi tartarici	0,4
Natrii citrici	0,2
Acidi citrici	0,35
Aquae purificatae	9,0
Celugeli	ad 50,0
M.f. gelatum	

D.S. żel nawilżająco-regenerujący do stosowania w jamie ustnej, 2-4 x dziennie

Do smarowania skóry po radioterapii

Rp.

Vit. D3 liq.	3,0
Linomag liq.	7,0
Oleogeli	ad 100,0
M.f. gelatum	

D.S. 2x dziennie

Zaburzenia lękowe u pacjentów z dysfagią

Rp.

Recepta pełnopłatna

Pregabalini	0,05-0,3
Witepsoli	q.s.
M.f. supp. analia	

D.S. 2x dziennie

Świąd skóry po chemioterapii

Rp.

Procaini hydrochloridi	8,0
Acidi tartarici	5,0
Chlorali hydrati	0,6
Mentholi	0,8
85% Glycerini	10,0
60% Spir. Vini	ad 200,0
M.f. solutio	

D.S. 3 - 4 x dziennie

Podmiot odpowiedzialny:

