



Informacja dla lekarza

W materiale przedstawiono kilka złożonych zestawień składów, przydatnych w praktyce lekarza ginekologa.

Leki recepturowe uzupełniają armamentarium w stanach chorobowych wymagających doraźnego zastosowania preparatu w zindywidualizowanej dawce bądź stężeniu. Preparaty rekomendowane są w doraźnym leczeniu stanów wymagających szybkiego działania, takich jak zakażenia bakteryjne, grzybicze, pierwotniakowe, stany zapalne.

W podanych przepisach uwzględniono podłoża żelowe (**Celugel i Oleogel**) oraz nowoczesne podłoże do sporządzania czopków i globulek – **Witepsol H15**.

Zaletą leków wykonanych z tym podłożem jest:

- brak konieczności przechowywania w lodówce (z wyjątkiem preparatów z nystatyną);
- zgodność z substancjami stosowanymi w recepturze;
- dobre wchłanianie (w wyniku emulgowania z płynami jam ciała);
- odporność na jęłczenie;
- wygoda aplikacji.

Recepturowe leki ginekologiczne

Zakażenia Rzęsistkiem, nieswoiste zakażenia pochwy

Rp.

Clindamycini hydrochloridi	0,2
Acidi borici	0,06
Metronidazoli	0,5
Witepsoli	q.s.
M.f.glob.vag.	D.t.d. No 12 lub 24

D.S. dopochwowo 1 (lub 2) x dziennie
1 globulkę

Wskazania: zakażenia rzęsistkiem,
nieswoiste zakażenia pochwy

Ostre zakażenia bakteryjno-pierwotniakowe

Rp.

Metronidazoli	0,5 (lub 1,0)
Detreomycini	0,3
Acidi borici	0,1
Sacchari Lactis	0,15
Witepsoli	q.s.
M.f.globul.vaginal.	D.t.d. N° 12

D.S. 1 globulkę na noc

Wskazania: Ostre zakażenia
bakteryjno-pierwotniakowe

Atrofia błony śluzowej pochwy

Rp.

Vit. E puri	
Dimeticoni	aa 0,04
Glyceroli 85%	0,1
Witepsoli	q.s.
M.f.glob.vag.	D.t.d. N° 12 lub 24

D.S. dopochwowo 1 (lub 2) x dziennie
1 globulkę

Wskazania: atrofia błony śluzowej pochwy

Mieszane zakażenia bakteryjno- grzybicze, z towarzyszącym świądem

Rp.

Gentamycini sulfurici	0,08
Prednisoloni	0,004
Clotrimazoli	0,2
Acidi borici	0,06
Witepsoli	q.s.
M.f.globul.vaginal.	D.t.d. N° 12

D.S. 1 globulkę na noc

Wskazania: Mieszane zakażenia
bakteryjno-grzybicze z towarzyszącym
świądem

Zapalenia bakteryjne reagujące na linkozamidy

Rp.

Clindamycini hydrochloridi	0,2
Acidi borici	0,04
Sacchari Lactis	0,2
Witepsoli	q.s.
M.f.globul.vaginal.	D.t.d. N° 12

D.S. 1 globulkę na noc

Wskazania: Zapalenia bakteryjne reagujące
na linkozamidy

Wirusowe zapalenie pochwy

Rp.

Acicloviri (ex Heviran)	0,8
Sacchari Lactis	0,2
Vit. A	5000 j.m.
Witepsoli	q.s.
M.f.globul.vaginal.	D.t.d. N° 12

D.S. 1 globulkę na noc

Wskazania: Wirusowe zapalenie pochwy
Pełnopłatna

Prezentowane składy leków recepturowych są przykładem możliwości technologicznych postaci leku wykonywanego w zakresie receptury aptecznej. Ostateczną decyzję na temat: składu, stężenia substancji, dawkowania u pacjenta podejmuje lekarz na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia.

Rp. Leczenie zakażeń grzybiczych

Nystatini	10 mln j.m.
Glyceroli 85%	
Acidi lactici	aa 5,0
Celugeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

D.S. 1 raz na noc

Wskazania: leczenie zakażeń grzybiczych

Rp. Leczenie stanów drożdżakowych z towarzyszącym świądem

Nystatini	10 mln j.m.
Benzocaini	1,0
Glyceroli 85%	3,0
Celugeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

Ds. 1-2 x dziennie

Wskazania: Leczenie stanów drożdżakowych z towarzyszącym świądem

Rp. Działanie regenerująco-odżywcze, po kuracji antybiotykowej

Acidi lactici	0,03
Vit. E puri	0,04
Witepsoli	q.s.
M.f.globul.vaginal.	D.t.d. N° 24

D.S. 1 globulkę na noc

Wskazania: Działanie regenerująco-odżywcze, po kuracji antybiotykowej (Kurację można powtórzyć)

Rp. Liszaj twardzinowy

Benzocaini	5,0
Prednisoloni	0,25
Glyceroli 85%	2,5
Celugeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

D.S. 1 – 3 x dziennie

Wskazania: Hydrożel do stosowania w okolicach sromu, napletka oraz w pozagenitalnych obszarach występowania liszaja twardzinowego.

Rp. Leczenie grzybic

Cupri sulfurici	0,3
Aquae purificatae	1,5
Celugeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

D.S. 1 raz dziennie

Wskazania: Leczenie grzybic

Rp. Zakażenia pierwotniakowe pochwy

Resorcini	
Acidi borici	aa 0,06
Balsami peruviani	
Ol. Ricini	aa 0,1
Witepsoli	q.s.
M.f. glob.vag.	D.t.d. N° 24

D.S. 1 x 1 czopek dopochwowo

Wskazania: Rzęsistkowica

Recepturowe leki ginekologiczne

Działania odżywczo-regenerujące np. po kuracji antybiotykowej, w marskości

Rp.

Vit. A	10 000 j.m.
Glyceroli 85%	0,1
Witepsoli	q.s.
M.f.globul.vaginal.	D.t.d. N° 24

D.S. 1 globulkę na noc

Wskazania: Działanie
odżywczo-regenerujące np. po kuracji
antybiotykowej, w marskości

Żel natłuszczająco-nawilżający

Rp.

Vit. E puri	1,0
Cholesteroli	4,0
Aquae purificatae	20,0
Oleogeli	ad 100,0
M.f.cremor	

D.S. 2 -3 x dziennie do nawilżania sromu

Wskazania: Marskość sromu

Zakażenia bakteryjne pochwy

Rp.

Clindamycini	
hydrochloridi	(od) 0,1 (do) 0,3
Witepsoli	q.s.
M.f.glob.vag.	D.t.d. N° 12 lub 24

D.S. dopochwowo 1 (lub 2) x dziennie
1 globulkę

Wskazania: Zakażenia bakteryjne

Stany bakteryjne ze świądem reagujące na klindamycynę

Rp.

Clindamycini	
hydrochloridi	0,075 (do 0,3)
prednisoloni	0,002
Acidi borici	0,03
Witepsoli	q.s.
M.f.globul.vaginal.	D.t.d. N° 12

D.S. 1 raz co 12 godz., lub 1 raz
co 24 godz. (wg wskazań lekarza)

Wskazania: Stany bakteryjne ze świądem,
reagujące na klindamycynę

Tłusty żel do pielęgnacji skóry „pod pamperssem”, niwelujący zapachy

Rp.

Ol. Menthae piperitae	gtt. 4 (0,076)
Oleogeli	ad 200,0
M.f. gelatum	

D.S. 2-3 x dziennie

Wskazania: Zapobieganie maceracji skóry

Do irygacji pochwy

Rp.

0,4% sol. Clindamycini	
hydrochloridi	250,0
M.f.sol.	

D.S. do irygacji pochwy 1 x wieczorem,
po 20-40 ml

Wskazania: Do irygacji pochwy

Podmiot odpowiedzialny:


Actifarm[®]
receptura+

Actifarm sp. z o.o.
Ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa
Tel.: +48 22 212 89 89

Oddział Kraków
ul. Bociana 22a
31-231 Kraków

Dział sprzedaży:
m: +48 513 463 570
fax: +48 22 212 87 16
zamowienia@actifarm.pl
biuro@actifarm.pl

www.actifarm.pl



Obserwuj nas

 **actifarm**